


Plan de rotation des points d'injection

Chaque jour de la semaine, choisissez une zone différente pour l'injection du médicament.



N'oubliez pas : Il y a de nombreux points d'injection dans chacune des sept zones d'injection.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser Acétate de glatiramère injectable, veuillez lire les Renseignements sur le médicament pour le patient de la monographie du produit.

Emplacement

Jour

Réglage de la profondeur

**Partie supérieure du
dos du bras droit**
(région charnue)

**Partie supérieure du dos
du bras gauche**
(région charnue)

**Haut de la fesse
droite**
(sous la taille)

**Haut de la fesse
gauche**
(sous la taille)

Partie avant et externe de la cuisse droite
(5 cm au-dessus du genou et
5 cm sous l'aîne)

Partie avant et externe de la cuisse gauche
(5 cm au-dessus du genou et
5 cm sous l'aîne)

Ventre
(Région de l'abdomen; laisser un espace de 5 cm autour du nombril)

Il est important de faire la rotation des points d'injection.

Il y a **7 zones possibles** pour les injections d'acétate de glatiramère sur votre corps, et de nombreux points d'injection dans chaque zone. Un plan de rotation vous aide à éviter d'injecter le médicament aux mêmes points d'injection plus d'une fois par semaine.

Faites toujours la rotation de vos points d'injection

- ✓ Il y a 7 zones possibles pour les injections d'acétate de glatiramère sur votre corps (voir au verso).
- ✓ **Chaque seringue préremplie ne doit être utilisée que pour l'injection sous-cutanée.**
- ✓ Il peut être utile de noter l'emplacement de chaque point d'injection. Utilisez le plan de rotation que votre professionnel de la santé a créé pour vous.
- ✓ **N'injectez jamais le médicament au même endroit (point) plus d'une fois par semaine, ou à répétition.**
- ✓ Regardez et touchez chaque point d'injection potentiel avant de choisir lequel utiliser. Évitez d'injecter le médicament dans des points qui présentent des bosses, des creux, des cicatrices ou d'autres irrégularités. N'injectez pas le médicament dans une zone où la peau présente des cicatrices ou des « creux ». Cela pourrait endommager la peau encore davantage.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser Acétate de glatiramère injectable, veuillez lire les Renseignements sur le médicament pour le patient de la monographie du produit.

Composez le 1 888 223-0038
pour obtenir le soutien du
personnel infirmier
relatif à vos injections

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE à 20 mg/mL (une fois par jour) **est utilisé pour traiter les patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente**, y compris ceux qui ont subi un épisode de symptômes touchant le système nerveux et qui présentent des examens d'IRM cérébrale anormaux qui peuvent être les premiers signes de la sclérose en plaques.

ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE n'est pas un traitement curatif. Les patients traités par ce médicament présentent moins de rechutes (poussées de la maladie).

N'utilisez pas ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE si vous êtes allergique au glatiramère ou au mannitol ou si la solution contenue dans la seringue préremplie est trouble, fuit ou contient des particules.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et d'assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé **tous vos problèmes de santé**, notamment si vous souffrez d'une maladie cardiaque, avez des antécédents de réactions allergiques graves, êtes atteint de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou d'asthme, présentez des problèmes rénaux ou hépatiques, êtes enceinte, prévoyez devenir enceinte, ou si vous devenez enceinte pendant que vous prenez ce médicament, si vous allaitez ou si vous avez moins de 18 ans.

Mentionnez à votre professionnel de la santé **toute la médication que vous prenez**, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les médicaments alternatifs.

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez **ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE**. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé. Les effets secondaires les plus courants d'**ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE** sont les suivants : réactions cutanées au point d'injection, y compris la rougeur, la douleur, l'inflammation, les démangeaisons, l'enflure, des bosses, un creux permanent sous la peau au point d'injection, provoqué par une destruction du tissu adipeux à ce point; les éruptions cutanées, l'urticaire, les maux de tête; un sentiment d'inquiétude, de nervosité, de malaise (anxiété).

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en visitant le site Web des déclarations des effets indésirables

(<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou en téléphonant sans frais au 1 866 234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Pour en savoir plus sur ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient en visitant le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp>), le site Web du fabricant (<http://www.viatris.ca>) ou en téléphonant au 1 888 223-0038.