

TAPIS DE PRÉPARATION

1

WhisperJECT^{MD}
AUTO-INJECTEUR

Destiné à être utilisé avec ^{Pr}Acétate de glatiramère injectable présenté dans une seringue en verre préremplie BD^{MD} de 1,0 mL munie d'une aiguille fixe d'un calibre 27 à 29

2

Seringue préremplie en verre de 1,0 mL

**Fournitures supplémentaires
dont vous avez besoin :**

- Un chiffon propre et humide
- Un contenant pour objets pointus et tranchants
- Un endroit pour consigner votre injection

3

Tampon
imbibé
d'alcool

4

Tampon
d'ouate

Veuillez consulter les renseignements sur le médicament pour le patient à la page suivante. Pour obtenir des instructions sur l'injection, veuillez consulter la monographie du produit, y compris les renseignements sur le médicament pour le patient et le mode d'emploi. Veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec votre auto-injecteur *WhisperJECT*^{MD}.

Composez le 1 888 223-0038
pour obtenir de l'aide
relative aux injections offerte
par le personnel infirmier.

Le produit Acétate de glatiramère injectable de Viatriis est disponible sur ordonnance seulement.

BD^{MD} est une marque déposée de Becton, Dickinson and Company.

WhisperJECT^{MD} et le logo d'Acétate de glatiramère injectable sont des marques de commerce de Mylan Pharmaceuticals, Inc., utilisées avec permission par de Mylan Pharmaceuticals ULC, une société de Viatriis.

VIATRIS et VIATRIS & Design sont des marques de commerce de Mylan Inc., utilisées avec permission par Mylan Pharmaceuticals ULC, une société de Viatriis. ©2024 Viatriis Inc. Tous droits réservés. GA-2023-0110F – AL2024

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

Le produit ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE à 20 mg/mL (une fois par jour) **est utilisé pour traiter les patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente**, y compris ceux qui ont subi un épisode de symptômes touchant le système nerveux et qui présentent des examens d'IRM cérébrale anormaux qui peuvent être les premiers signes de la sclérose en plaques.

Le produit ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE n'est pas un traitement curatif. Les patients traités par ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE présentent moins de rechutes (poussées de la maladie).

N'utilisez pas ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE si vous êtes allergique au glatiramère ou au mannitol ou si la solution contenue dans la seringue préremplie est trouble, fuit ou contient des particules.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et d'assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé **tous vos problèmes de santé**, notamment si vous souffrez d'une maladie cardiaque, avez des antécédents de réactions allergiques graves, êtes atteint de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou d'asthme, présentez des problèmes rénaux ou hépatiques, êtes enceinte, prévoyez devenir enceinte ou si vous devenez enceinte pendant que vous prenez ce médicament, si vous allaitez ou si vous avez moins de 18 ans.

Mentionnez à votre professionnel de la santé **toute la médication que vous prenez**, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les médicaments alternatifs.

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé. Les effets secondaires les plus courants d'ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE sont les suivants : réactions cutanées au point d'injection, y compris la rougeur, la douleur, l'inflammation, les démangeaisons, l'enflure, des bosses, un creux permanent sous la peau au point d'injection, provoqué par une destruction du tissu adipeux à ce point; les éruptions cutanées, l'urticaire, les maux de tête; un sentiment d'inquiétude, de nervosité, de malaise (anxiété).

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou téléphonant sans frais au 1 866 234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Pour en savoir plus sur ACÉTATE DE GLATIRAMÈRE INJECTABLE :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Trouver la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient, en visitant le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp>), le site Web du fabricant (<http://www.viatris.ca>) ou en téléphonant au 1 888 223-0038.