



**Dites  
OUI**

à un traitement  
qui s'adapte  
à vos besoins



**Pr Acétate de glatiramère  
injectable**

20 mg/mL

Le présent guide sur l'auto-injection ne remplace pas une consultation avec votre médecin au sujet de votre état de santé ou de votre traitement.

## UTILISATION

Le produit Pr Acétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL (1 fois par jour) est utilisé pour traiter les patients atteints de sclérose en plaques (SP) rémittente, y compris ceux qui ont subi un épisode de symptômes neurologiques et qui présentent des anomalies à l'imagerie cérébrale susceptibles d'être les premiers signes de sclérose en plaques.

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

N'utilisez pas le produit Acétate de glatiramère injectable si vous êtes allergique au glatiramère ou au mannitol ou si la solution contenue dans la seringue préremplie est trouble, fuit ou contient des particules.

**Cliquez ici** pour les renseignements sur le médicament pour le patient relatifs au produit Acétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL.

**Cliquez ici** pour le mode d'emploi fourni avec votre autoinjecteur *WhisperJECT*<sup>MD</sup>.



**VIATRIS**<sup>SMC</sup>

# Caractéristiques de l'autoinjecteur *Whisper*JECT<sup>MD</sup>

L'autoinjecteur *Whisper*JECT<sup>MD</sup> est destiné à l'emploi avec les seringues préremplies du produit <sup>Pr</sup>Acétate de glatiramère injectable. L'autoinjecteur *Whisper*JECT est un dispositif réutilisable pour l'injection sous-cutanée<sup>1</sup>.

**Référence :** 1. Mode d'emploi de l'autoinjecteur *Whisper*JECT<sup>MD</sup>. Etobicoke (Ontario) : Mylan Pharmaceuticals ULC. 2023.

## Poignée texturée

conçue pour une bonne prise en main et une injection stable

## Grandes fenêtres de visualisation

des deux côtés vous permettant de **confirmer visuellement la fin de l'injection**

## Protecteur d'aiguille

qui masque l'aiguille pendant l'auto-injection

**Multiples réglages de profondeur de l'aiguille,** soit de 4, de 6, de 8 et de 10 mm permettant d'**adapter les injections aux différents types de corps et aux différentes zones d'injection**

## Dispositif de retrait du couvre-aiguille

permettant de retirer le couvre-aiguille en toute sécurité et de vous éviter de voir l'**aiguille avant l'injection**

[Cliquez ici](#) pour le mode d'emploi fourni avec votre autoinjecteur *Whisper*JECT<sup>MD</sup>.



N'hésitez pas à nous  
contacter en cas de besoin!

**(1 888 223-0038)**



**VIATRIS ADVOCATE est un programme de soutien aux patients** qui vous aide avec le traitement par <sup>Pr</sup>Acétate de glatiramère injectable.

**Notre personnel infirmier ayant de l'expérience avec la SP peut vous aider individuellement de diverses façons**

- Passer en revue le processus d'injection étape par étape pour vous aider à acquérir la bonne technique d'injection;
- Vous aider à adapter votre routine de façon à modifier vos habitudes de vie, pour une modification du poids, par exemple
- Vous donner des conseils sur la préparation, l'administration, l'entreposage et la mise au rebut de votre médicament;
- Vous fournir des outils de suivi des auto-injections;
- Vous mettre en relation avec des ressources de soutien et vous encourager à participer à la communauté de la SP;
- Vous aider à prendre contact avec un réseau de soutien.

### **RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ**

Dans les études, les effets secondaires du produit Acétate de glatiramère injectable les plus fréquents sont les suivants : rougeur, douleur, enflure, démangeaisons ou bosse au point d'injection; éruptions cutanées; essoufflement et bouffées congestives. Le produit Acétate de glatiramère injectable pourrait avoir d'autres effets secondaires que ceux qui figurent sur cette liste.

**Cliquez [ici](#) pour les renseignements sur le médicament pour le patient relatifs au produit Acétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL.**


**Cliquez [ici](#) pour le mode d'emploi fourni avec votre autoinjecteur *WhisperJECT*<sup>MD</sup>.**

## La trousse de bienvenue VIATRIS ADVOCATE contient les éléments suivants :

1. une pochette en néoprène;
2. un coupe-aiguille;
3. un aimant VIATRIS ADVOCATE;
4. une brochure sur le programme VIATRIS ADVOCATE;
5. un Guide d'auto-injection avec l'autoinjecteur *WhisperJECT*<sup>MD</sup>;
6. une lettre de présentation du programme VIATRIS ADVOCATE.



Lettre de bienvenue



Étui en néoprène



Aimant du programme VIATRIS ADVOCATE



Brochure du programme VIATRIS ADVOCATE



Coupe-aiguille  
©2010 Becton Dickinson.



Guide pour l'auto-injection

Pour en savoir plus sur le programme de soutien aux patients, consultez la brochure sur le programme VIATRIS ADVOCATE **disponible dans votre trousse de bienvenue.**

# Guide d'auto-injection avec l'autoinjecteur *WhisperJECT*<sup>MD</sup>



Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
[glatiramacetate.ca/fr-ca](http://glatiramacetate.ca/fr-ca).


## Consignation du jour et du point d'injection

Rendez-vous sur le site Web [www.glatirameracetate.ca/fr-ca](http://www.glatirameracetate.ca/fr-ca) pour télécharger gratuitement votre plan de rotation et y consigner vos injections du produit <sup>Pr</sup>Acétate de glatiramère injectable.

### Acétate de glatiramère injectable

## Plan de rotation des points d'injection

Chaque jour de la semaine, choisissez une zone différente pour l'injection du médicament.



**N'oubliez pas :** Il y a de nombreux points d'injection dans chacune des sept zones d'injection.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser le produit Acétate de glatiramère injectable, veuillez lire les Renseignements sur le médicament pour le patient de la monographie du produit.

Emplacement	Jour	Réglage de la profondeur
Partie supérieure du dos du bras droit <small>(région charnière)</small>		
Partie supérieure du dos du bras gauche <small>(région charnière)</small>		
Haut de la fesse droite <small>(sous la taille)</small>		
Haut de la fesse gauche <small>(sous la taille)</small>		
Partie avant et externe de la cuisse droite <small>(5 cm au-dessus du genou et 5 cm sous l'aîne)</small>		
Partie avant et externe de la cuisse gauche <small>(5 cm au-dessus du genou et 5 cm sous l'aîne)</small>		
Ventre <small>(région de l'abdomen; laisser un espace de 5 cm autour du nombril)</small>		



Tenir un journal de vos points d'injection, comme le plan de rotation, aide à éviter de faire plus d'une injection par semaine dans un même point d'injection



Vous pouvez consigner l'emplacement, le jour et le réglage de la profondeur de votre injection dans votre *plan de rotation*. Le fichier PDF peut être téléchargé depuis le site Web [glatirameracetate.ca/fr-ca](http://glatirameracetate.ca/fr-ca).



Pour plus de renseignements, reportez-vous à la section *Soutien à l'injection* du site Web [glatirameracetate.ca/fr-ca](http://glatirameracetate.ca/fr-ca).

**Cliquez ici** pour les renseignements sur le médicament pour le patient relatifs au produit Acétate de glatiramère injectable à **20 mg/mL**.


**Cliquez ici** pour le mode d'emploi fourni avec votre autoinjecteur **WhisperJECT<sup>MD</sup>**.

## 7 zones d'injection possibles

Il existe 7 zones d'injection possibles. Choisissez une zone différente à chaque injection.

Chaque zone d'injection contient plusieurs points d'injection.

**Évitez de faire l'injection plus d'une fois par semaine au même point d'injection.**



**Cliquez ici** pour les renseignements sur le médicament pour le patient relatifs au produit Acétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL.

**Cliquez ici** pour le mode d'emploi fourni avec votre autoinjecteur *WhisperJECT*<sup>MD</sup>.

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

Le produit <sup>Pr</sup>Acétate de glatiramère injectable à 20 mg/mL (1 fois par jour) **est utilisé pour traiter les patients atteints de sclérose en plaques (SP) rémittente**, y compris ceux qui ont subi un épisode de symptômes neurologiques et qui présentent des anomalies à l'imagerie cérébrale susceptibles d'être les premiers signes de sclérose en plaques.

Bien que le produit Acétate de glatiramère injectable ne soit pas un traitement curatif, les patients traités par ce médicament ont subi moins de poussées.

**N'utilisez pas le produit Acétate de glatiramère injectable si** vous êtes allergique au glatiramère ou au mannitol ou si la solution contenue dans la seringue préremplie est trouble, fuit ou contient des particules.

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre le produit Acétate de glatiramère injectable, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament.**

Mentionnez à votre professionnel de la santé **tous vos problèmes de santé**, notamment si : vous avez une maladie cardiaque; vous avez des antécédents de réactions allergiques graves; vous souffrez de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC); vous souffrez d'asthme; vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques; vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, ou devenez enceinte pendant que vous prenez ce médicament; vous allaitez; ou vous avez moins de 18 ans.

Mentionnez à votre professionnel de la santé **toute la médication que vous prenez**, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les médicaments alternatifs.

En prenant le produit Acétate de glatiramère injectable, vous pourriez ressentir d'autres effets secondaires que ceux qui figurent sur cette liste. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé. Les effets secondaires le produit Acétate de glatiramère injectable les plus fréquents sont les suivants : réactions cutanées au point d'injection, y compris rougeur, douleur, inflammation, démangeaisons, enflure, bosses; creux permanent sous la peau au point d'injection,

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT (SUITE)

provoqué par une destruction du tissu adipeux à ce point; éruption cutanée; urticaire; maux de tête; sentiment d'inquiétude, de nervosité, de malaise (anxiété).

### Déclaration des effets secondaires

**Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation de produits à Santé Canada en visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour obtenir des renseignements sur la façon de faire une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur; ou composez sans frais le 1 866 234-2345.**

***REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.***

**Pour en savoir plus sur le produit <sup>Pr</sup>Acétate de glatiramère injectable :**

**Communiquez avec votre professionnel de la santé.**

**Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp>) ou sur le site Web du fabricant (<https://www.viatrix.ca/fr-ca>). On peut aussi se le procurer en téléphonant au 1 888 223-0038.**

*WhisperJECT®* et le logo d'Acétate de glatiramère injectable sont des marques de commerce de Mylan Pharmaceuticals, Inc., utilisées avec permission par Mylan Pharmaceuticals ULC, une société de Viatrix.

Viatrix Advocate<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Mylan Inc., utilisée avec permission par Mylan Pharmaceuticals ULC, une société de Viatrix.

VIATRIS et VIATRIS & Design sont des marques de commerce de Mylan Inc., utilisées avec permission par Mylan Pharmaceuticals ULC, une société de Viatrix. ©2024 Viatrix Inc. Tous droits réservés.

GA-2024-0033F - AL2024